

## **32** SEGUIMENT ACTIU I MESURES DE RECUPERACIÓ DE PACIENTS EN TRACTAMENT DE LA INFECCIÓ TUBERCULOSA PER INFERMERIA EN UNA UNITAT ESPECIALITZADA

**Autors:** Cantos A, Barrios M, Lozano P, Mata C, Jallas M, Lara E.

**Institucions:** Unitat de Prevenció i Control de la Tuberculosi. CAP Drassanes. Servei d'Atenció Primària Suport al Diagnòstic i al Tractament. Institut Català de la Salut. Barcelona.

### **OBJECTIUS**

Avaluar l'eficàcia de les mesures de recuperació (MR) de pacients en tractament de la infecció tuberculosa (TIT) utilitzades en les consultes d'infermeria d'una unitat de referència.

### **MATERIALS I MÈTODES**

Estudi prospectiu dels TIT indicats a la nostra unitat durant l'any 2005. Les pautes van ser: rifampicina i isoniacida 3 mesos (3RH); isoniacida 6 mesos (6H); isoniacida 9 mesos (9H). Es van recollir dades sociodemogràfiques, procedència (contactes laborals, familiars, escolars i altres), nombre de visites realitzades i tècniques de recuperació utilitzades (trucades telefòniques i cartes).

### **RESULTATS**

De 360 pacients que van iniciar TIT, 200 (58,1%) el van completar sense cap intervenció. Dels restants, 88 (25,6%) van necessitar MR i 56 (16,3%) es van perdre malgrat les MR. Van ser retirats 16 TIT (4,4%) per reaccions adverses. Es van enviar 40 cartes i es van fer 228 trucades telefòniques. Els pacients més receptius a les MR van ser els procedents de Bolívia, amb el 54,2 % de recuperació. En relació al sexe, es van recuperar més homes (27,4%) que dones (23,4%). La pauta més recuperada va ser la 6H amb el 28,8%.

### **CONCLUSIONS**

L'aplicació de mesures de recuperació va permetre recuperar fins a una quarta part dels pacients en TIT. És fonamental la participació de personal d'infermeria especialitzat en les consultes de les unitats de tuberculosi per millorar el control de la tuberculosi.